

IMPFUNG	ALTER	in Wochen		in Monaten										in Jahren					
		6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60
		U4		U5		U6		U7		U7a/U8		U9	U10	U11/J1		I2			
Rotaviren		G1 <sup>a</sup>	G2	(G3)															
Tetanus <sup>b</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>			N				A1	N	A2	N	A <sup>e</sup>		
Diphtherie <sup>b</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>			N				A1	N	A2	N	A <sup>e</sup>		
Keuchhusten <sup>b</sup> Pertussis		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>			N				A1	N	A2	N	A3 <sup>e</sup>	N	
Hib <sup>b</sup> Haemophilus influenzae Typ b		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>			N										
Kinderlähmung <sup>b</sup> Poliomyelitis		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>			N				A1				N		
Hepatitis B <sup>b</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>							N						
Pneumokokken <sup>b</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>			N									S <sup>f</sup>	
Meningokokken C								G1					N						
Masern						G1	N		G2					N				S <sup>f</sup>	
Mumps, Röteln						G1	N		G2					N					
Windpocken Varizellen						G1	N		G2					N					
HPV Humane Papillomviren														G1 <sup>d</sup> G2 <sup>d</sup>	N				
Herpes zoster																		G1 <sup>h</sup> G2 <sup>h</sup>	
Grippe Influenza																		S (jährlich)	
<b>FSME (Zecke)</b>																		ab 3J. G1,2 1jahr später G3 N	

ERLÄUTERUNGEN

- G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 3 Teilimpfungen G1 – G3)
- S** STANDARDIMPFUNG
- A** AUFRISCHIMPFUNG
- N** NACHHOLIMPFUNG (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
- U** Früherkennungsuntersuchung
- J** Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12–14 Jahren)

- a** Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen.
- b** Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.
- c** Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate.
- d** Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter  $\geq 15$  Jahren oder bei Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich.
- e** Td-Auffrischung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung 1-malig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

- f** Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen  $\geq 18$  Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.
- g** Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.
- h** Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten.
- \* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.



**Impfkalender in 20 Sprachen (RKI)**  
Vaccination calendar in 20 languages (RKI)



**6fach-Impfung**  
6-in-1 vaccine



**Pneumokokken-Impfung**  
Pneumococcal vaccine



**Rotavirus-Impfung**  
Rotaviruses vaccine



**MMR-Impfung**  
Combination vaccine: measles, mumps, rubella



**Windpocken-Impfung**  
Chicken pox vaccine



**Meningokokken-B-Impfung**  
Meningococcal disease vaccine



**Meningokokken-C-Impfung**  
Meningococcus C vaccine



**Influenza-Impfung**  
Flu vaccine



**Tdap-IPV-Impfung**  
Combination vaccine: Tetanus, diphtheria, whooping cough, polio



**Hepatitis-A-Impfung**  
Hepatitis-A vaccine



**Reisemedizin**  
Fit for Travel